

意見書

牛久市社会福祉協議会
牛久ふれあい保育園
牛久ふれあい保育園ひたち野うしく駅前分園 園長殿

入園児童名

病名「」
年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので
登園可能と判断します。

医療機関

年 月 日 医師名 印またはサイン

切り取り線

感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう下記の感染症について意見書をお願い致します。感染力のある時期に配慮し、子供の健康回復状態が集団での保育生活が可能な状態になってからの登園である様ご配慮ください

	感染しやすい時期	登園のめやす
麻疹（はしか）	発症1日前から発疹出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
風疹	発疹出現の前7日から後7日間くらい	発疹が消失してから
水痘（水ぼうそう）	発疹出現1～2日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮してから
流行性耳下腺炎 おたふくかぜ	発症3日前から耳下腺腫脹後4日間	耳下腺 顎下腺 舌下腺の腫脹が発見してから5日を経過するまでかつ全身状態が良好になるまで
結核		医師により感染の恐れがないと認めるまで
咽頭結膜熱（プール熱）	発熱充血など症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失すまでまたは7日間の適正な抗生物質による治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症 (0157 026 0111等)		症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し48時間をあけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎	ウィルスが呼吸器から1～2週間便から数週間～数か月排出される	医師により感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認めるまで
流行性結膜炎（はやり目）	充血 目ヤニなどが出現した数日間	感染力が非常に強いいため結膜炎の症状が消失してから